- Mauricio Manzione -



PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS
GUÍA DE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS DE VALOR ESPECIAL

Programa Áreas Protegidas del Centro Este
Dirección Nacional de Conservación

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
APN
ARGENTINA

PARQUE NACIONAL
CIERVO DE LOS PANTANOS

GUÍA DE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS DE VALOR ESPECIAL



PP **LOBITO DE RÍO -** *Lontra longicaudis*



PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

GUÍA DE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS DE VALOR ESPECIAL




MM

Mauricio Manzione

PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

GUÍA DE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS DE VALOR ESPECIAL



PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

GUÍA DE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS DE VALOR ESPECIAL

Administración de Parques Nacionales
Dirección Nacional de Conservación
Programa Áreas Protegidas
del Centro Este

Equipo de trabajo:
Contenido: Mauricio Manzione.
Colaboradores: Luciana Fabris, Cecilia Li Puma, Lorena Pérez Carusi, Hernán Ibáñez.
Cartografía: Mariana Lípori, Cecilia Palacio.
Correcciones: Pablo Reggio,
Revisión: Mariana Altamiranda.
Correción de estilo: María Victoria Alonso Casellas
Diseño e ilustraciones: Cristian Blanco.
Gestión administrativa: Mara Soto Mercerat - June Asher Arce

Foto tapa:
Gonzalo Álves

Fotos contratapa:
Fila superiror
Alec Earnshaw
Pablo Petracci
Marcelo Canevari
Fila inferior
Fundación Killifish/SIB
Silvina Enrrieti
Marcelo Canevari

Hecho el depósito Ley 11.723
1ra edición digital-
agosto de 2026
Fecha de catalogación: 24/08/2026

Manzione, Mauricio
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos: guía de las especies de vertebrados de valor especial / Mauricio Manzione; Prólogo de Lorena Pérez Carusi. - 1a ed. ilustrada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Administración de Parques Nacionales, 2026.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-1363-51-3

1. Conservación del Patrimonio. 2. Fauna Argentina. 3. Parques Nacionales. I. Pérez Carusi, Lorena, prolog. II. Título.

CDD 333.783

Administración de Parques Nacionales
Dirección Nacional de Conservación
Av. Rivadavia 1475 (C1033AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
argentina.gob.ar/parquesnacionales

Los usuarios pueden mezclar, transformar y crear a partir del contenido de nuestra publicación para fines no comerciales, bajo la condición de que toda obra derivada de la publicación original sea distribuida bajo la misma licencia. La Administración de Parques Nacionales deberá ser claramente identificada como propietaria de los derechos de autor de la publicación original.

PRÓLOGO

La presente guía es el resultado de un proceso de trabajo colectivo impulsado y coordinado desde el Programa Áreas Protegidas del Centro Este de la Dirección Nacional de Conservación, iniciado en el año 2020 con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre las Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVE) del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y generar una herramienta que contribuya a su conservación.

A partir de un proceso de identificación, registro y sistematización de información, acompañado por instancias de capacitación e intercambio con el personal del área protegida, se buscó reconocer aquellas especies cuya conservación requiere especial atención por su estado de conservación, sus características ecológicas, su singularidad biogeográfica, su grado de especialización o su importancia cultural. Este trabajo permitió establecer prioridades para la gestión, el monitoreo y la investigación, orientando las acciones de conservación en el territorio.

La elaboración de esta guía fue posible gracias al aporte conjunto de guardaparques, técnicos y brigadistas del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, quienes, a través de años de relevamientos, monitoreos y registros, generaron la información que sustenta esta publicación. Sobre esa base, se desarrolló y organizó el contenido técnico de la guía, integrando ese conocimiento en una herramienta orientada a la gestión y la conservación. Finalmente, el equipo del Programa de Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio llevó adelante el diseño editorial y la propuesta gráfica, dándole forma a una publicación accesible y de utilidad para la gestión, la investigación y la divulgación.

Esta publicación reúne ese conocimiento colectivo con el propósito de facilitar la identificación y el reconocimiento de las EVVE del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos por parte del personal del área protegida, la comunidad científica y el público interesado. Asimismo, busca promover la generación de nuevos registros que continúen ampliando el conocimiento sobre la biodiversidad del parque y fortalezcan las acciones de conservación.

Esperamos que esta guía acompañe las tareas de quienes trabajan en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, facilite la identificación y el registro de las EVVE, promueva la generación de nueva información y fortalezca las acciones de conservación en el territorio. Porque cada observación, cada registro y cada monitoreo amplían el conocimiento sobre la biodiversidad del parque y fortalecen las acciones para su conservación. Que esta guía sea una compañera de ese trabajo cotidiano y una invitación a seguir construyendo, entre todos, el conocimiento necesario para proteger este patrimonio natural.



RNF

Lorena Perez Carusi
Responsable Programa Áreas Protegidas del Centro Este
Dirección Nacional de Conservación- APN

AGUARÁ POPÉ - *Procyon cancrivorus*

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer especialmente a:

Lorena Perez Carusi, Cecilia Li Puma, Luciana Fabris, Hernán Ibañez y Cristian Blanco.

Al Personal del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en particular a Daniela Gangi y Gonzalo Álves.

A Marcelo Canevari, Adriana Almirón, Jorge Casciotta, Liliana Ciotek, Pablo Giorgis Silvina Enrieti, Pablo Petracci, Julián Alonso, Sebastián Preitz, José Aparicio, Jorge López Soriano, Mario Beade, Ezequiel Bonafede, Héctor Ball, Claudio Díaz Timm, Jorge Merigi, Patrick Monney, Jorge Meriggi, Walter Prado, Soledad Castillo, Astrid Sanguometto, Fernando Flores, Alec Earnshaw, Gabriela Agostini, Ignacio Roesler, Helena Gangeroba, Adelmir Jeromino, Nick Attanas, Eduardo Militello, Silvia Vitale, Romina Achirri, Ron Knigh, Joaquín Ghiorzo, Emilio Martín Pérez, Ariel López, Gerardo Vega, Gonzalo Álvarez, Killi Fundation y la Reserva Natural Provincial Rincón de Santa María.

A la Dirección Nacional de Conservación, principalmente al Programa Áreas Protegidas del Centro Este: Leonardo Raffo, Ana Martelli, Gino Pittelli, Camila Abarca y Gabriela Espinosa. Al Programa Manejo de Recursos Naturales: Guadalupe Arata, Valeria Bauni, Lucía Chust, Natalie Citón y María Graziani; y al Programa de Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio, en especial a Pablo Reggio, Mara Soto Mercerat y María Victoria Alonso Casellas.



ESCUERCITO COMÚN - *Odontophrynus americanuss*

ÍNDICE

Prólogo 07
Agradecimientos 08
Nuestros Parques Nacionales 12
Una herramienta para resguardar el patrimonio natural y cultural 12
Conservación y áreas protegidas 13
Las especies de vertebrados de valor especial (EVVEs) 14
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos 16
El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y sus EVVEs 17
Nomenclatura e iconografías 19

Mulita grande
Dasypus novemcinctus 20
Zorro gris pampeano
Lycalopex gymnocercus 22
Zorro de monte
Cerdocyon thous 24
Gato montés
Leopardus geoffroyi 26
Hurón menor
Galictis cuja 28
Lobito de río
Lontra longicaudis 30
Aguará popé
Procyon cancrivorus 32
Ciervo de los pantanos
Blastocerus dichotomus 34
Carpincho
Hydrochoerus hydrochaeris 36
Coipo /falsa nutria
Myocastor coypus 38
Pava de monte ribereña
Penelope obscura 40
Lechuzón de campo
Asio flammeus 42
Carpintero blanco
Melanerpes candidus 44
Carpintero bataraz chico
Dryobates mixtus 46
Pajonalera pico curvo
Limnornis curvirostris 48
Pajonalera pico recto
Limnoctites rectirostris 50
Espartillero pampeano
Asthenes hudsoni 52
Espartillero enano
Spartonoica maluroides 54
Viudita pico celeste
Knipolegus cyanirostris 56

Juan chiviro
Cyclarhis gujanensis 58
Pecho colorado
Leistes superciliaris 60
Federal
Amblyramphus holosericeus 62
Boyero negro
Cacicus solitarius 64
Reinamora grande
Cyanoloxia brissonii 66
Capuchino canela
Sporophila hypoxantha 68
Capuchino garganta café
Sporophila ruficollis 70
Capuchino pecho blanco
Sporophila palustris 72
Capuchino castaño
Sporophila hypochroma 74
Cardenal copete rojo
Paroaria coronata 76
Frutero azul
Stephanophorus diadematus 78
Culebra acuática marrón
Erythrolamprus semiaureus 80
Culebra verde /culebra esmeralda
Philodryas aestiva 82
Falsa yarará ocelada
Tomodon ocellatus 84
Yarará grande
Bothrops alternatus 86
Tortuga de río
Hydromedusa tectifera 88
Tortuga pintada
Trachemys dorbigni 90
Escuerzo común
Ceratophrys ornata 92
Ranita trepadora pintada
Nyctimantis (Argenteohyla) siemersi 94
Rana silbadora
Physalaemus fernandezae 96
Culebra ciega del Río de la Plata
Chthonerpeton indistinctum 98

Listado de las especies de vertebrados de valor especial del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos 101
Epílogo 109
Notas 110
Glosario 115
Bibliografía 117



CARPINCHO - *Hydrochoerus hydrochaeris*

MC

¡Bienvenidos a la Guía de Especies de Vertebrados de Valor Especial del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos!

NUESTROS PARQUES NACIONALES

La Administración de Parques Nacionales (APN) es el organismo responsable de gestionar las áreas protegidas más relevantes del país, concebidas como espacios destinados a la conservación del patrimonio natural y cultural, la investigación científica, el turismo sostenible y el desarrollo local. Entre sus principales funciones se encuentra el diseño, la conducción y el control de políticas orientadas a la conservación y manejo de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Nacionales y demás áreas protegidas bajo jurisdicción nacional, tanto las existentes como aquellas que puedan incorporarse en el futuro. Su objetivo central es garantizar la integridad de estos espacios, resguardando sus características fisiográficas, sus asociaciones bióticas, sus recursos naturales y culturales, así como la calidad ambiental de los asentamientos humanos vinculados a ellos. En este sentido, la APN administra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que actualmente comprende 55 áreas protegidas, entre las cuales se encuentra el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

UNA HERRAMIENTA PARA RESGUARDAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Los espacios de territorio de superficie variable en el que existen muestras representativas de la naturaleza y la cultura regional en buen estado de conservación pueden ser área protegidas. Para ello deben ser reconocidas formalmente. Estos espacios son piezas de un mosaico territorial, donde coexisten regiones rurales, poblados, ciudades, zonas de uso pesquero, entre otras. Las áreas protegidas se diferencian por tener grandes limitaciones en la explotación y aprovechamiento de sus recursos y, por otro lado, brindan otro tipo de beneficios a la sociedad como consecuencia de sus interacciones con el resto de la matriz territorial.



ÁGUILA PESCADORA - *Pandion haliaetus*

CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS

Las áreas protegidas contienen elementos naturales y culturales particulares, que son parte de la razón de ser de estas, convirtiendo a cada una en única y especial. Tales elementos poseen una importancia intrínseca singular y de conjunto. Su existencia es clave para impulsar la creación de las áreas protegidas y dedicar esfuerzos a su conservación a perpetuidad. Estos elementos son denominados valores de conservación y contemplan paisajes, ecosistemas, comunidades, poblaciones, procesos naturales o manifestaciones y rasgos socioculturales e históricos, incluyendo el uso de los recursos u otro interés particular de actores que se relacionen con el área protegida.



PERDIZ COLORADA - *Rhynchotus rufescens*

LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS DE VALOR ESPECIAL (EVVES)

Dentro de los valores de conservación, la Administración de Parques Nacionales selecciona y mantiene actualizado un listado, de cada área protegida y monumento natural, de las especies animales de valor seleccionadas por su importancia de conservación, según los siguientes criterios (1):

1. Especies o subespecies incluidas en alguna categoría de amenaza a nivel nacional (según la normativa vigente) de la cual se dispone de información científica que indica que la población local tiene problemas de conservación, listada como "insuficientemente conocida" o con "datos insuficientes" en los libros rojos a nivel nacional o de la que se presuma tiene problemas de conservación a nivel local (principio precautorio).

2. Especie o subespecie endémica de la unidad de conservación y/o su entorno inmediato o que posee características ecológicas y/o genéticas diferenciales del resto del resto de su distribución fuera del área protegida.

3. Especie o subespecie con escasa presencia a nivel poblacional en el sistema de Áreas Nacionales Protegidas que justifique una atención especial.

4. Especie o subespecie de la cual una fracción importante de su distribución en la Argentina (mayor al 10%) se encuentra en el área protegida.

5. Especie o subespecie que fue registrada habitualmente hasta cinco (5) años atrás en el área protegida, pero no se ha registrado desde entonces.

6. Especie o subespecie que pertenece a una familia monotípica (singularidad taxonómica).

7. Especie o subespecie clave para la estructuración y el funcionamiento de un ecosistema o para la persistencia de otra especie.

8. Especie o subespecie especialista en algún recurso, siempre y cuando esta especialización represente un aumento de la vulnerabilidad de la especie, por ejemplo, especies especializadas en un tipo de hábitat o en un ítem alimentario raro o escaso.

9. Especie o subespecie particularmente valorada por la sociedad, por ejemplo, especies con valor simbólico-ritual, utilizada como recurso (medicinal, alimenticio, indumentario, ornamental, etc.), emblemática, etc.




ÁGUILA NEGRA (juvenil) - *Buteogallus urubitinga*

EL PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

Creado en el año 2018 por Ley Nacional 27456/18, tiene una superficie de 5.200 ha. Se ubica en el noreste de la provincia de Buenos Aires. El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos se establece sobre la base de la Reserva Natural Otamendi, originalmente creada en 1990 como Reserva Natural Estricta por Decreto Nacional Nº 2149/90. A la vez fue declarada como Sitio Ramsar y Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA).

Resguarda ambientes representativos de tres ecorregiones: un desnivel constituido por una barranca con bosque de talas *(Celtis tala),* afines a los bosques de la ecorregión del Espinal que separa un sector o terraza alta con elementos de la ecorregión Pampa, y una terraza baja, con humedales que se corresponden con la ecorregión Delta e islas del rio Paraná (Figura I).



PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

Mapa de Ambientes

Fuente: Riedel, I. & Schivo, F. (2025).

Instituciones participantes:
APN-PNCP, APN-PAPCE, Instituto 3iA-UNSAM, CONICET.

Figura I

Su clima es Templado húmedo con temperaturas medias de 23,4°C en enero (el mes más cálido) y 10°C en julio (el mes más frío). Los 1.000 mm de precipitaciones se reparten de manera pareja a lo largo del año, aunque llueve con mayor intensidad en los meses cálidos, con heladas probables de mayo a noviembre.

EL PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS Y SUS EVVEs

En función de los criterios presentados anteriormente, distintos sectores de la Administración de Parques Nacionales como el personal del área protegida en conjunto con el Programa de Áreas Protegidas Centro Este y la Dirección Nacional de Conservación realizaron un listado de Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVEs) para el Parque Nacional. Este listado es una base para resolver distintos aspectos técnico-administrativos además de priorizar los esfuerzos de observación y registro por parte de los guardaparques y técnicos, y los esfuerzos de investigación y monitor.

En el Parque Nacional Ciervo de Los Pantanos se definieron 103 EVVEs de las cuales se seleccionaron 40 como prioritarias. Estas últimas especies se presentan aquí con imágenes y una descripción mínima que facilita su identificación a campo. Asimismo, se detalla la totalidad de EVVEs en formato de checklist (lista de chequeo) hacia el final de la obra. Por último, en el cierre, el usuario de esta guía encontrará páginas en blanco que pretenden ofrecer un espacio para anotaciones y bocetos de especies observadas. En este sentido, el objetivo de esta guía es acercar al público en general, guardaparques, brigadistas de incendios forestales y técnicos, al reconocimiento de las especies y generar información sobre ellas en el área protegida.

¡Qué disfruten el Parque Nacional y sus valores de conservación!



RANA TRACTOR - *Nyctimantis (Argenteohyla) siemersi*


MC

[1] RESOLUCIÓN 180-94 PD APROBAR LISTADO ESPECIE VERTEBRADOS DE VALOR ESPECIAL PARA PARQUES Y MONUMENTOS PATAGONIA




PP **PECHO COLORADO -** *Leistes superciliaris*

NOMENCLATURA E ICONOGRAFÍAS



Huellas
Lt
Largo total

- Comparación con humanos



- Dimensiones:

C-C: cabeza-cuerpo

C: cola

A: asta

AM *Amenazada (AM): según MADS y AA*

MAMÍFEROS- Formula dentaria:

I: Incisivo

C: Canino

P: Premolar

M: Molar

Categoría de la lista roja de especies amenazadas - UICN

EX Extinto	EW Extinto en Estado Silvestre	CR En Peligro Crítico
EN En Peligro	VU Vulnerable	NT Casi Amenazado
LC Preocupación Menor	DD Datos Insuficientes	NE No Evaluado

UICN RED LIST	*Lista Roja - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza*
MADS	*Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación*
SAyDS	*Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación*
SAREM	*Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos*
AA	*Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata*

MAMÍFEROS Estado de conservación: según SAyDS-SAREM, 2019 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina - Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos). Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de los mamíferos de Argentina. Versión digital: http://cma.sarem.org.ar. 2019.

AVES Estado de conservación: Vulnerable (VU): según MADS y AA, 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Aves Argentinas). Categorización de las Aves de la Argentina según su estado de conservación. Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas.

ANFIBIOS Y REPTILES Estado de conservación según SAyDS, 2013 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). Categorización de anfibios y reptiles de Argentina. Lista de reptiles y anfibios endémicos de Argentina (Res. 1055). 2013.

Mulita grande *Dasypus novemcinctus*



Familia: Dasypodidae

Dimensiones: C-C: 35-60 cm, C: 13-19 cm.

Fórmula dentaria: I 0/0, C 0/0, PM 0/0, M 7-9/7-9, para un total de 28-36 dientes.

Otros datos diagnósticos: excava cuevas de hasta 6 m de largo y bocas de unos 20 cm de diámetro.


Descripción: mulita de mayor tamaño. Generalmente 9 bandas móviles, aunque puede variar entre 8 y 11. El caparazón color pardo grisáceo oscuro, con escamas amarillentas de variada intensidad sobre todo en los costados. Cuerpo con pocos pelos. Cabeza triangular, con hocico largo y angosto; las orejas alargadas con sus bases muy próximas entre sí en el dorso de la cabeza. Extremidades cortas y robustas. Patas anteriores con 4 dedos, los del medio más largos y con garras fuertes. Patas posteriores con 5 dedos de uñas más cortas. La cola, relativamente larga, se afina gradualmente hacia la punta y en sus dos tercios proximales las escamas que la recubren están dispuestas en anillos.

Alimentación: principalmente insectos como hormigas y termitas. También, pequeños vertebrados, frutos y raíces.

Reproducción: una camada de 4 crías al año.

Hábitos: solitaria. Crepuscular y nocturna.

Hábitat: amplia variedad de hábitats principalmente selvas, bosques en galería, montes. En el área habita el pastizal de la terraza alta.





PP

Zorro gris pampeano *Lycalopex gymnocercus*



Familia: Canidae

Dimensiones: C-C: 44-72 cm, C: 25-41 cm.

Fórmula dentaria: : I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 2/3, para un total de 42 dientes.

Otros datos diagnósticos: : parecido al zorro de monte, más estilizado. Hocico y orejas más largas, patas claras y cola más larga y voluminosa. Marca su territorio con excremento. Generalmente silencioso, emite gritos secos y fuertes (como ladrido extendido).

Descripción: : pelaje entremezclado de negro y blanco amarillento. Más negro en el dorso. Cara y orejas ocres amarillentas. Mandíbula negra. La garganta, pecho y el vientre blanco sucio. Patas amarillento rojizo. Posterior del muslo de las patas traseras con una gran mancha negra. Cola larga y espesa, con mancha negra en el dorso de la base y otra en el extremo.

Alimentación: omnívoro y oportunista. Pequeños mamíferos, aves, huevos, reptiles, insectos y frutos y plantas.

Reproducción: principalmente en primavera. En madrigueras nace una camada de 2 a 5 crías, ambos padres crían los cachorros.

Hábitos: solitario, principalmente crepuscular y nocturno, aunque también activo durante el día. Para refugiarse y criar a sus cachorros usa vizcacheras y cuevas de peludos o mulitas, a las que ensancha y condiciona, pero también suele usar huecos de árboles u otras oquedades.

Hábitat: variedad de ambientes, especialmente abiertos, praderas, sabanas. También, en áreas rurales y suburbanas. En el parque habita el talar y pastizal de la terraza alta.



Lt - 5-6 Cm



Zorro de monte *Cerdocyon thous*



Familia: Canidae

Dimensiones: C-C: 55-77 cm, C: 20-40 cm.

Fórmula dentaria: : I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 2/3, para un total de 42 dientes.

Otros datos diagnósticos: parecido al zorro gris pampeano. Más robusto. Hocico y orejas más cortas, patas oscuras y cola comparativamente más corta y menos abultada.

Descripción: pelaje más bien corto y grueso. Coloración general pardo claro, con sectores bayos en algunos individuos. Dorso oscuro con pelos bayos o amarillentos formando una banda. Ventral grisáceo o anaranjado pálido. Cola oscura en lo dorsal y la punta. Base externa de las patas oscuras. Orejas redondeadas.

Alimentación: omnívoro y oportunista. Crustáceos, insectos, arañas, pequeños mamíferos, aves, reptiles y frutos. También carroña.

Reproducción: principalmente en verano. En madrigueras nace una camada de 3 a 6 crías, ambos padres crían los cachorros.

Hábitos: solitarios, en parejas y grupos familiares. Crepuscular y nocturno, aunque también durante el día.

Hábitat: variedad de ambientes, especialmente abiertos, praderas, sabanas. También, en áreas rurales y suburbanas. En el área protegida ocupa la terraza alta (pastizal y talar).

Lt - 4,5 cm





Gato montés *Leopardus geoffroyi*



Familia: Felidae

Dimensiones: C-C: 600-670 cm; C: 270-300 cm; oreja, 5-6,5 cm.

Fórmula dentaria: I 3/3 C 1/1 P 3/3 M 1/0 para un total de 26 dientes.

Otros datos diagnósticos: fecas similares a las de gato doméstico. Frecuentemente depositadas en lo alto de árboles (plataformas, ramas y troncos).

Descripción: gato silvestre de pelaje grisáceo amarillento, más oscuro en el dorso y casi blanco ventralmente. Con manchas negras pequeñas que pueden formar bandas en cuello, lomo y extremidades. Alrededor de ojos y boca, blanco a crema. Dorso de orejas color negro, con mancha central blanca. Cola con 12 a 16 anillos negros. También, individuos totalmente negros (melánicos).

Alimentación: principalmente pequeños roedores (cuises y ratones), liebre europea, aves, lagarto overo y otros reptiles, anfibios e insectos.

Reproducción: anualmente tiene dos a tres crías por camada.

Hábitos: generalmente nocturnos, aunque también puede vérselo durante el día. Se adapta a ambientes muy diversos. Buen trepador, prefiere sitios arbolados y rocosos. Recorre incluso ambientes inundados. Buen nadador. Descansa en árboles durante el día.

Hábitat: muy variado. Sabanas y bosques. En otras regiones desde selvas de montaña hasta desiertos y áreas cercanas a humanos (antropizadas). En el parque ocupa la terraza alta (talar) y terraza baja (pastizal salino, pajonal, bosque ribereño).



Lt - 3,5 cm



MC

Hurón menor *Galictis cuja*



Familia: Mustelidae

Dimensiones: C-C: 27,3-52 cm. C: 13,5-19 cm.

Fórmula dentaria: I 3/3, C 1/1, PM 3/3, M 1/2 para un total de 40 dientes.

Otros datos diagnósticos: "vincha" blanca y vocalizaciones consistentes en gruñidos agudos y ladridos secos.

Descripción: cuerpo alargado y angosto, con las patas y la cola muy cortas. Cabeza chata, con hocico afinado y las orejas redondeadas y cortas. Patrón de coloración: dorso amarillento claro mezclado de negro. Partes ventrales y patas color negro. Franja blanca en la frente prolongada hacia atrás por el cuello hasta los hombros. La coloración corporal puede variar incluso en una misma localidad.

Alimentación: carnívoro. Pequeños y medianos vertebrados, como cuises y otros roedores, liebre europea, reptiles terrestres (en especial lagartijas), anfibios, aves y huevos.

Reproducción: en primavera dentro de madrigueras propias o cavadas por otro animal. Camada de 2 a 5 crías.

Hábitos: solitarios o pequeños grupos familiares. Diurno y nocturno. Ágil en tierra, se refugia en huecos en troncos, cuevas, grietas y madrigueras excavadas por otros animales como armadillos o vizcachas.

Hábitat: ambientes muy variados, preferentemente abiertos montes, sabanas, pastizales. También cerca de áreas rurales y urbanas. En el parque se le encuentra en el pastizal y talar de la terraza alta.



Lt - 4,6 cm



JAp

Lobito de río *Lontra longicaudis*



Familia: Mustelidae

Dimensiones: C-C: 50-79 cm
C: 37-57 cm.

Fórmula dentaria: I 3/3, C 1/1, P 4/3, M 1/2. para un total de 36 dientes.

Otros datos diagnósticos: huella con 5 dedos palmeados. Deposita excrementos en sitios visibles como plataformas de vegetación y troncos que afloran del agua.

Descripción: carnívoro de hábitos acuáticos. Cabeza más bien corta y ancha en la base. Cuello largo y ancho. Cuerpo esbelto y flexible, con la cola larga y gruesa que se afina hacia la punta. Patas cortas con cinco dedos unidos por una membrana interdigital completa. Pelaje denso y brillante. Variable en coloración. Generalmente pardo oscuro, o pardo acanelado lustroso, ventralmente pardo claro a blancuzco, con la garganta más clara. Los machos son de mayor tamaño.

Alimentación: se alimenta principalmente de peces, crustáceos y moluscos. También pequeños mamíferos, aves, reptiles e insectos.

Reproducción: generalmente en primavera. Pare entre 1 y 5 crías en el interior de cuevas excavadas por la hembra u otras ya existentes. Cuidado de crías exclusivo de las hembras.



Hábitos: generalmente diurno. Solitario, o en grupos familiares. Evasivo. Alarmado puede emitir gruñidos y "silbidos" agudos. Ágil nadador, ondula el cuerpo y la cola para desplazarse. Con frecuencia bucea por períodos de no más de 30 segundos. En tierra suele pararse en dos patas para examinar el entorno a mayor distancia.

Hábitat: vive en ríos, arroyos, lagunas, y otros cuerpos de agua dulce. Prefiere costas con barrancas y vegetación. Tolera ambientes modificados por humanos. En el Parque Nacional ocupa las lagunas de la terraza baja, el Río Paraná de las Palmas y canales como los que bordean el camino Islas Malvinas.



JLS

Aguará popé *Procyon cancrivorus*



Familia: Procyonidae

Dimensiones: C-C: 55-87 cm; C: 26-42 cm.

Fórmula dentaria: I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 2/2 para un total de 40 dientes.

Otros datos diagnósticos: huella de pata delantera recuerda pequeña mano humana que se detecta fácilmente en orillas barrosas de cuerpos de agua. Vocalización fuerte y áspera.

Descripción: rechoncho y algo encorvado. Pelaje más o menos largo; dorsalmente oscuro con otras partes del cuerpo con pelos negros, grises y amarillentos entremezclados. Vientre claro. Cara con "antifaz" oscuro bordeado de blanquecino. Cola larga con anillos oscuros y punta negra. Hocico angosto y orejas más bien cortas. Patas negras, las traseras un poco más largas y robustas que las delanteras. Dedos largos y los de la mano muy separados.
El macho es poco más grande que la hembra.

Alimentación: principalmente animales pequeños como cangrejos, peces, anfibios y caracoles a los que golpea en el suelo (como si los estuviera lavando). También insectos, aves y frutos.



Lt - 5 cm

Reproducción: poco conocida. Utiliza huecos en troncos donde pare de 2 a 7 crías.

Hábitos: solitarios. Crepuscular y nocturno. Buen nadador y trepador. Generalmente se lo ve en orillas de ríos, arroyos, lagunas y otros cuerpos de agua. Busca su alimento a orillas del agua, metiendo las manos y tanteando bajo la superficie.

Hábitat: vive en ambientes variados asociados a ambientes acuáticos. Pastizales, sabanas, selvas y bosques.



Lt - 8 cm



HB

Ciervo de los pantanos *Blastocerus dichotomus*



Familia: : Cervidae

Dimensiones: C-C: 153-200 cm; C: 12-17 cm; A: 110-130 cm.

Fórmula dentaria: Il 0/3, C 0-1/1, P 3/3, M 3/3 para un total de 32-34.


Otros datos diagnósticos: únicamente macho con cornamenta grande y gruesa de 8 a 12 puntas, (raramente hasta 29 puntas). Frota las astas en troncos de árboles para quitarles la felpa y deja marcas en la corteza.

Descripción: el mayor ciervo nativo de Sudamérica. Cuerpo robusto. Patas largas y estilizadas. Cada pata con dos pezuñas largas y una membrana interdigital (adaptación a ambientes palustres). El pelaje, más largo que en otros cérvidos, es anaranjado a rojizo y se desluce en otoño e invierno. Color blanco en garganta y papada, alrededor de los ojos, labio inferior e interior de las orejas. El hocico es negro al igual que la mitad inferior de las patas (guantes) y ventral de la cola. La cría es similar a la hembra adulta.

Alimentación: herbívoro. Partes blandas de arbustos y árboles (brotes y hojas), gramíneas y plantas acuáticas. Varía estacionalmente.

Reproducción: durante todo el año. En el Delta del Paraná picos de nacimiento entre septiembre y noviembre. La cría permanece junto a su madre cerca de un año.

Hábitos: solitario, en parejas o en pequeños grupos. Varia su actividad entre diurna o nocturna dependiendo de actividad humana, lluvias y temperatura. Sigiloso. Amenazado, huye dando saltos elevando la cola. Excelente nadador. Durante las inundaciones y debido a la modificación de su hábitat realiza migraciones en busca de zonas altas más favorables.



Hábitat: en la región vive en pajonales inundables, cerca de selvas y monte nativos. Visita bosques implantados (pinares, sauzales, frutales) y otros cultivos, siempre cerca del agua. En el Parque Nacional ocupa los ambientes acuáticos y sus inmediaciones (pastizal salino, pajonal) de la terraza baja.



Carpincho *Hydrochoerus hydrochaeris*



Familia: Caviidae

Dimensiones: C-C: 107-134 cm C: 1-2 cm.

Fórmula dentaria: I 1/1, C 0/0, P 1/1, M 3/3 para un total de 20 dientes.

Otros datos diagnósticos: huellas características. Excrementos, de forma ovalada y color pardo oscuro, depositados en pilas.

Descripción: roedor de mayor tamaño del mundo. Robusto y cabezón. Orejas pequeñas, ojos y orificios nasales en la parte superior de la cabeza. Patas cortas, 4 dedos en las delanteras y 3 en las traseras unidos por una membrana interdigital parcial. Cola extremadamente corta (no visible a simple vista). Pelaje color pardo, con tonalidades rojizas, grisáceas o amarillentas, más oscuro cuando está mojado. El hocico del macho ostenta una protuberancia oscura y libre de pelos.

Alimentación: herbívoro. Hierbas costeras, plantas acuáticas, pastos y otras plantas terrestres. Además, frutos y flores. Roe la corteza de árboles.

Reproducción: todo el año, aunque mayormente en primavera y verano. Una camada al año de 2 a 7 crías.

Hábitos: generalmente activo a la mañana y al anochecer, gregario, forma grupos familiares de entre 6 y 30 individuos, incluso hasta 60 durante épocas de sequías. Para desplazarse en tierra generalmente utilizan los mismos senderos. Amenazado, emite gritos de alarma parecidos a un ladrido ronco; si el peligro aumenta, se zambulle en el agua. Ágil nadador. Sumergido, sólo asoman fuera del agua los ojos, las orejas y los orificios nasales.

Hábitat: vive en una amplia variedad de ambientes, como sabanas, bosques y selvas, siempre en zonas cercanas al agua. En el parque ocupa los ambientes acuáticos y sus inmediaciones (pajonal, bosque ribereño) de la terraza baja.



Lt - 4.5 cm



Lt - 5 cm



MB

Coipo /falsa nutria *Myocastor coypus*



Familia: Myocastoridae

Dimensiones: C-C: 43-64 cm
C: 25-43 cm.

Fórmula dentaria: I 1/1, C 0/0, P 1/1, M 3/3 para un total de 20.

Otros datos diagnósticos: excrementos alargados y estriados.

Descripción: roedor robusto y de gran tamaño. Cabeza grande, con abundantes vibrisas (bigotes) largas en el hocico. Orejas pequeñas, ojos y orificios nasales en la parte superior de la cabeza. Patas anteriores cortas con 5 dedos (4 más largos que el pulgar). Patas posteriores robustas, con 5 dedos (4 unidos por una membrana interdigital completa). Cola larga, con pocos pelos y de apariencia escamada. Pelaje en dos capas: una externa de pelos más largos y de aspecto hirsuto, de color pardo amarillento a rojizo y otra interna compacta pardo oscuro. Macho más grande que la hembra.

Alimentación: herbívoro. Principalmente gramíneas y hierbas acuáticas. También plantas terrestres. Fuera del agua come sentado sobre sus patas traseras sosteniendo el alimento con las delanteras.

Reproducción: 2 o 3 camadas de 2 a 13 crías durante todo el año.

Hábitos: en parejas o en grupos. Forma colonias cuando abunda el alimento. Más bien crepuscular y nocturno. Nada con rapidez manteniendo parte de la cabeza y el lomo fuera del agua. Alertado se zambulle. Construye galerías subterráneas en las orillas, donde se refugia. Algunas con varios túneles y diferentes entradas. Además, construye plataformas en la orilla o sobre plantas flotantes (60-80 cm de diámetro), para comer y descansar. En tierra se desplaza con agilidad.

Hábitat: ríos, arroyos, bañados, pantanos, esteros y lagunas, generalmente con abundante plantas flotantes y emergentes. Incluso en aguas salobres y también costas marinas. Terraza baja: ambientes acuáticos y pajonales.



Lt - 4 cm



Lt - 12 cm



MB

Pava de monte ribereña *Penelope obscura*



Familia: : Ceracidae

Dimensiones: 70 cm.

Otros datos diagnósticos: oscura con leves estrías blancas en cabeza, cuello y pecho, más notable en las alas. Garganta roja.

Voz: llamada bajo, fuerte, nasal y áspero "shiaak shiaak shiak…". Además, el macho realiza un vuelo territorial con fuerte y sonoro batir de alas que se acelera hacia el final "trrr, trrr, rr, r, r, r…".

Descripción: plumaje pardo oscuro con tornasolado verdoso. Corona con fino lineado blanco que puede ser menos abundante según los individuos. Cuello, pecho y dorso de las alas lineado de blanco. Zona desnuda de la cara, negruzca. Garganta con excrecencia carnosa roja. Vientre pardo. Pico y patas negruzcos. Macho con iris rojizo anaranjado. Hembra con iris pardo. Juvenil: similar a los adultos, sin lineado blanco ni coloración roja.

Alimentación: principalmente frutos. En menor medida hojas y flores. Se alimenta tanto en los árboles como en el suelo.

Reproducción: nidifica en árboles. El nido es una plataforma de unos 60 cm de diámetro de ramas y hojas, bien oculto entre la vegetación. Pone hasta 3 huevos crema.

Hábitos: solitaria, en parejas o pequeños grupos. Baja mucho al suelo, buscando alimento caminando. Generalmente, el vuelo es potente y más bien corto. En algunos sitios, arisca.

Hábitat: ocupa los bosques del talar y ribereño de las terrazas alta y baja. También bosques modificados.



Lechuzón de campo *Asio flammeus*



Familia: Strigidae

Dimensiones: 38 cm.

Otros datos diagnósticos: más bien diurno. Barreado y moteado en dorso. Estriado ventralmente. Iris amarillo.

Voz: Agudo y nasal "ée ée" como voz de alarma.

Descripción: lechuza grande, muy diurna y de pastizales. Partes dorsales pardo oscuro, moteado y barrado de pardo muy claro. Las partes ventrales son blanquecinas con estrías gruesas verticales color pardo que se afinan hacia el abdomen. Patas emplumadas. Cara acanelada y blanquecina. "Anteojos" oscuros contrastados con iris amarillo. Pico negro. Hembra levemente más grande y oscura.

Alimentación: pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

Reproducción: abril a junio. Nidifica en el suelo en pastizales o juncales densos. El nido es una plataforma de pastos. Pone hasta 5 huevos. La hembra incuba. El macho aporta alimento y defiende el nido.

Hábitos: sobrevuela pastizales, arbustales y campos a baja altura principalmente al amanecer y al atardecer. Suele posarse en postes y el suelo

Hábitat: pastizales y áreas abiertas. En el área protegida habita el pastizal de la terraza alta.



Egagrópila
(tamaño real)



Carpintero blanco *Melanerpes candidus*


PW

Familia: Picidae

Dimensiones: 24-29 cm.

Otros datos diagnósticos: blanco. Espalda, lomo y cola negras. Nuca y vientre amarillos. Hembra con nuca blanca.

Voz: estridente y repetido "kírr-kírr-kírr…" o "wirr wirr wirr…".

Descripción: llamativo. Mayormente blanco. Cabeza con línea ocular negra que se extiende hasta la espalda. Espalda, lomo y alas negros. Cola negra con manchas blancas en plumas externas. Nuca y centro del vientre color amarillo. Periocular amarillo. Iris marfil. Hembra: sin amarillo en la nuca. Juvenil: más pálido, con anillo ocular grisáceo. Patas y pico grises.

Alimentación: principalmente frutas, semillas y miel. Insectos y sus larvas. Caza insectos en vuelo.

Reproducción: septiembre a diciembre. Nido en huecos de árboles y palmeras. Pone hasta 5 huevos blancos.

Hábitos: gregarios. En grupos pequeños recorriendo áreas abiertas. Muy vocalizador. Se posa en troncos secos y expuestos.

Hábitat: terraza baja. Generalmente en zonas abiertas bosques, sabanas y palmares.


MB

Detalle plumaje amarillento en la nuca del macho.



Carpintero bataraz chico *Dryobates mixtus*



Familia: Picidae

Dimensiones: 14 cm.

Otros datos diagnósticos: dorso negro con manchas blancas. Vientre blanquecino estriado de negro. Ceja blanca. Macho con nuca roja.

Voz: estridente y repetido agudo y fuerte "ti ti ti ti ti ti ti ti…". Además, muy rápido tamborileo sobre troncos.

Descripción: bataraz. Con el vientre blancuzco estriado de negro y flancos barrados. El dorso es negro completamente moteado de blanco, inclusive en las alas. Cola muy barrada de blanco. Ancha ceja blancuzca que se extiende hasta la espalda. Zona auricular negra. Bigote blanco y línea malar negruzca. Frente y corona negra punteado de blanco. Sexos diferentes: el macho tiene los lados de la nuca roja o anaranjada. Juvenil: tiene una coloración más apagada y oscura que el adulto, con estriado ventral más grueso, y con lados de la nuca rojos o anaranjados.

Alimentación: captura insectos o arañas en la corteza o picotea para capturar larvas en el interior de troncos y ramas, a las que retira con su larga lengua. También come frutos y semillas.

Reproducción: septiembre a diciembre. Nidifica en huecos en troncos o ramas a baja o media altura. Pone hasta 4 huevos blancos.

Hábitos: generalmente en parejas. Se mueve en el estrato medio de bosques o selvas

Hábitat: bosque de tipo chaqueño, palmares. También en áreas parquizadas. En el Parque Nacional ocupa el talar y el bosque ribereño.



Nido.



Pajonalera pico curvo *Limnornis curvirostris*



Familia: Furnariidae

Dimensiones: 18 cm.

Otros datos diagnósticos: pico mediano, curvo. Cola corta, redondeada (no en punta).

Voz: agudo "Chip chip chip chip terrrrrr…".

Descripción: pico mediano y curvo. Dorso canela rojizo ceja blanca. Partes dorsales canela rojizo. Hombros más castaños. Ceja blanquecina y línea detrás del ojo oscura. Iris oscuro. Alas y espalda baja (rabadilla) rojizos (rufo). Cola suavemente escalonada, redondeada (plumas sin punta). Partes ventrales blanquecinas, más claras en garganta y más canela en los flancos.

Alimentación: insectos.

Reproducción: nido globoso en plantas palustres. Lo construye con hierbas, hojas y fibras vegetales tejidas. Alero insinuado sobre la entrada. Pone hasta 2 huevos blancos.

Hábitos: permanece oculta en la vegetación. Al recorrer el pajonal genera sonidos en la vegetación seca. Fácil de ver mientras canta en sitios expuestos.

Hábitat: terraza baja (pajonales inundables). Humedales (Pajonales de paja brava, paja mansa). También humedales invadidos de lirio amarillo.



Pajonalera pico recto *Limnoctites rectirostris*



Familia: Furnariidae

Dimensiones: 17 cm.

Otros datos diagnósticos: pico muy largo y recto. Cola rojiza con plumas terminadas en punta.

Voz: Emite un trino "típ-típ-típ-ti-tititritrrrrrrr…" acelerado al final.

Descripción: pico largo, recto de color pardo oscuro. Base de la mandíbula blanco rosáceo. Ceja blanca. Partes dorsales pardas. Alas y cola rojiza, esta última graduada y con plumas terminadas en punta. Garganta y pecho color blanco. Vientre blanco parduzco. Lados del vientre (flancos) acanelados. Abdomen y subcaudal ocráceo. Iris castaño-anaranjado. Juvenil: más rojizo en partes dorsales y pardo ocráceo ventralmente.

Alimentación: principalmente Insectos.

Reproducción: nido ovalado construido con hojas de serrucheta (*Eryngium spp*), ramitas y juncos, con entrada lateral. Lo ubica cerca de 1 m de altura en la vegetación palustre. Pone hasta 3 huevos blancos.

Hábitos: solitaria o en parejas. Bastante tímida. Fácil de ver mientras canta en sitios expuestos.

Hábitat: comúnmente en humedales pantanosos, en ocasiones con árboles pequeños y arbustos. También en sitios más elevados y secos. Ocupa los pajonales inundables de la terraza baja), en particular los cardales de serrucheta en sitios anegados.



Sarrucheta.



Espartillero pampeano *Asthenes hudsoni*



Familia: Furnariidae

Dimensiones: 18 cm.

Otros datos diagnósticos: líneas blancuzcas en el dorso muy jaspeado. Flancos "rayados". Cola larga en punta.

Voz: estridente y repetido el macho canta sobre matas elevadas. Agudo y acelerado al final "ui chuiiiiiirrrch ".

Descripción: pico mediano. Partes dorsales pardo acanelado con ancho jaspeado oscuro y rayas blanco ceniza. Ceja crema blanquecina y corona estriada de oscuro. Partes ventrales pardo crema. Abdomen y sus costados acanelados con jaspeado oscuro. Alas en vuelo con banda ocrácea. Manchita debajo del pico (gular) anaranjado amarillento (no siempre presente). Cola con plumas en punta color pardo. Juvenil: pecho y sus costados estriados de pardo oscuro.

Alimentación: insectos y sus larvas (Escarabajos, mariposas, polillas, chinches, langostas, etc).

Reproducción: durante la primavera. Nido esférico de unos 10 cm de diámetro con entrada lateral. De pastos, ramitas. Internamente recubierto con plumas, hierbas, pelos y/o estiércol. Lo ubica en el suelo o muy cerca de él muy escondido en matas de pastos, cardos, juncos o alguna otra hierba. Pone hasta 5 huevos blancos.

Hábitos: solitario o en parejas. Confiado pero difícil de ver. Vuela bajo por cortas distancias y mueve la cola antes de descender velozmente a esconderse.

Hábitat: pajonales, espartillares, hunquillares, pastizales inundables con cortaderas cerca del agua. Pastizales y borde de bosques abiertos. En el área protegida ocupa los pastizales húmedos próximos a la estación ferroviaria Río Luján.



SC

Espartillero enano *Spartonoica maluroides*



Familia: Furnariidae

Dimensiones: 14 cm.

Otros datos diagnóstico: frente y corona rojiza. Dorso muy estriado de negro. Cola en puntas.

Voz: afino trino muy agudo (como grillo): "Trriu iiiiiiiirrrrrr, iu…". Reclamos: "chip".

Descripción: pequeño. Corona y frente rojiza (rufo). Iris blanquecino. Pico fino oscuro con mandíbula de base clara. Garganta y ceja blancuzcas. Partes dorsales pardo gris y ocráceo estriado de negro. Lados (flancos) del cuerpo pardo claro goteado/estriado de negro. Cola escalonada y terminada en puntas color pardo claro. Alas pardas. Remeras negras marginada de rojizo (rufo). Partes ventrales color blancuzco. Juvenil: similar al adulto. Corona parda. Iris oscuro. Ventral acanelado.

Alimentación: insectos.

Reproducción: anida entre la vegetación palustre. Nido abierto (aunque también puede hacerlo cerrado) de fibras vegetales. Pone 3 o 4 huevos blancos.

Hábitos: solitario o en pequeños grupos. Más bien oculto en la vegetación. Vuela realizando cortos recorridos escondiéndose nuevamente en la vegetación.

Hábitat: pastizales de aguas salobres y de agua dulce. También juncales, espartillares, y cardales de serruchetas (Eryngium spp). En el parque se encuentra en los pastizales húmedos próximos a la estación ferroviaria Río Luján y en los pajonales y pastizales salinos de la terraza baja (pajonales y pastizales salinos).



PP

Viudita pico celeste *Knipolegus cyanirostris*



Familia: Tyrannidae

Dimensiones: 15 cm.

Otros datos diagnósticos: pico celeste. Iris rojo. Macho negro. Hembra parda con vientre claro muy estriado.

Voz: generalmente silencioso. El macho emite sonidos cortos y metálicos "tsit…" a modo de llamado.

Descripción: viudita negra de pico celeste. Iris rojo, alas completamente negras. La hembra posee corona y partes dorsales pardo-castaña, alas oscuras con dos filetes claros. Partes ventrales claras con estriado pardo oliváceo bien notable. Espalda baja canela.

Alimentación: insectos que atrapa en vuelo o en el follaje. Desde ramas vuela a capturar su presa, para volver a su percha.

Reproducción: nido en forma de taza, construido con hierbas y otros materiales vegetales. Lo reviste de plumas. Lo ubica a baja o media altura en árboles, en ambientes con abundante vegetación. Pone hasta 3 huevos blancos con pocas pintas rojizas y grises.

Hábitos: en parejas o solitaria, generalmente en estrato bajo. Rara vez en estrato alto.

Hábitat: bosques nativos y selvas ribereñas con abundante vegetación, cerca del agua. Incluso en sitios degradados. En el área protegida ocupa los bosques del talar y ribereño de las terrazas alta y baja.

Presencia estacional: en otoño-invierno sus poblaciones se desplazan más al norte.



Hembra.

LC
UICN
RED LIST

LC
SAyDS-
SAREM



Juan chiviro *Cyclarhis gujanensis*



Familia: Vireonidae

Dimensiones: 15 cm.

Otros datos diagnósticos: pico robusto. Frente rojiza. Pecho amarillento. Dorso "verdoso".

Voz: rápido, bajo y musical "giuruglirigliri…" insistente.

Descripción: pico robusto de color grisáceo rosado (en vista frontal comprimido lateralmente). Mejillas y nuca grises. Corona parda, más rojiza hacia la frente. Partes dorsales y cola verde oliva. Pecho amarillo. Partes ventrales grisáceas. Iris anaranjado. El juvenil es más deslucido y tiene el iris pardo.

Alimentación: omnívoro. Artrópodos pequeños y frutos. También, pequeños vertebrados (ranas, lagartijas, serpientes, murciélagos y aves, incluidos los huevos y pichones).

Reproducción: nido semiesférico de líquenes, musgos liados con telarañas. Ubicado en horquetas o ramas horizontales, a media altura. Pone hasta 3 huevos blanco rosáceo, o crema rosado, con manchas pardas, rojizas y violáceas en uno de sus polos.

Hábitos: solitario o en parejas. Confiado. Frecuenta los estratos medio y alto. En otoño invierno integra bandadas mixtas.

Hábitat: en los bosques de talar, ribereño y arboledas de las terrazas alta y baja



Detalle lateral de su cabeza.



PP

Pecho colorado *Leistes superciliaris*



Familia: Icteridae

Dimensiones: 18 cm.

Otros datos diagnósticos: negruzco. Garganta, pecho y hombros rojos. Ceja blanca. Hembra pardo estriado con pecho y hombros rosados

Voz: alarmado, metálicos y agudos "tiing... tiing...". El macho se muestra en sitios visibles. En reproducción, realiza despliegue en vuelo.

Descripción: garganta, hombros y pecho rojo; contrastado con resto del cuerpo negruzco. Ceja blanca detrás del ojo. Fuera de la época de reproducción, plumas con reborde crema. Pico negro con base de la mandíbula clara. Hembra: parda, aperdizada con pecho y hombros rosados. Ceja y garganta ocráceas. Juvenil: semejante a la hembra. Macho: plumajes intermedios con el adulto. Especies semejantes: la loica común y la loica pampeana tienen el pico y la cola más largos y son de mayor tamaño.

Alimentación: insectos, arañas, semillas y frutos.

Reproducción: de octubre a febrero. Nidifica en una cavidad en el suelo, oculta entre pastizales. Pone hasta 5 huevos blanco-verdosos con pintas ocre en toda la superficie. Los nidos son parasitados por el tordo renegrido.

Hábitos: bandadas, incluso con otras aves. En parejas en la época de reproducción. Cuando corteja el macho se exhibe y canta en sitios despejados (postes de alambrados, arbolitos, hierbas o arbustos). Además, realiza un vuelo a modo de despliegue, se eleva para luego descender lentamente con las alas abiertas, mientras canta. La hembra, es más difícil de ver ya que se mimetiza oculta en pastizales.

Hábitat: pastizales, campos cultivados, campos abiertos, pasturas. En el Parque Nacional ocupa los pastizales y pajonales inundables de las terrazas alta y baja.



Juvenil.



PP

Federal *Amblyramphus holosericeus*



Familia: Icteridae

Dimensiones: 25 cm.

Otros datos diagnósticos: negro con "capucha" que cubre hasta el pecho y espalda, y muslos rojo-anaranjados.

Voz: alarmado, emite un "chac chac…". Silbos melodiosos semejantes a un "clioglie eerr eerr…" con tintes metálicos audible a distancia.

Descripción: inconfundible. Negro con capuchón que incluye el pecho y muslos anaranjado intenso. Pico cónico y puntiagudo color negro. Hembra apenas más pequeña que el macho. Juvenil: negro. Plumajes intermedios hasta llegar a la coloración adulta.

Alimentación: principalmente insectos, aunque también pequeños crustáceos y anfibios. Además, semillas. Con su pico especializado sondea y extrae larvas e insectos del interior de tallos de plantas palustres.

Reproducción: octubre a marzo. Nido en forma de taza profunda. Lo realiza con fibras de junco o espadaña atado a baja altura en las plantas acuáticas. Pone hasta 4 huevos celeste verdosos pálido con pintas y manchas pardo-oscuras.

Hábitos: en parejas. Integra bandadas fuera de la época de reproducción. Muy territorial con individuos de la misma especie y otras aves.

Hábitat: vegetación palustre en lagunas, bañados y esteros (pajonales, totorales, juncales). En el Parque Nacional ocupa los pajonales inundables de la terraza baja.




Detalle plumaje naranja en las patas.



SC

Boyero negro *Cacicus solitarius*



Familia: Furnariidae

Dimensiones: 24 cm.

Otros datos diagnósticos: negro. Pico marfil.

Voz: muy vocalizador. Tiene voces variadas con silbos y notas guturales. Áspero "uaagh-uaagh…". Imita el canto de otras aves.

Descripción: boyero grande y negro uniforme que contrasta con su recto pico color marfil. Iris pardo rojizo.

Alimentación: insectos y otros artrópodos, pequeños vertebrados, semillas, néctar, frutos.

Reproducción: cría entre octubre y diciembre. El nido es una bolsa colgante de 45 a 70 cm con entrada superior, realizada con fibras tejidas. Pone 2 ó 3 huevos blancos con pintas pardas.

Hábitos: solitario o en parejas. Se mueve acrobáticamente, principalmente en la parte baja de la vegetación. Rara vez en el suelo, donde se desplaza a los saltos.

Hábitat: bosque ribereño. Ambientes cercanos a cuerpos de agua como selvas en galería, bosques, sabanas y poblados.



Nido colgante.



NA

Reinamora grande *Cyanoloxia brissonii*


EM

Familia: Cardinalidae

Dimensiones: 15 cm.

Otros datos diagnósticos: pico grueso. Macho azul con frente y hombros celestes. Hembra pardo rojiza

Voz: agudo, melódico y variado "siu, siu, siu suifrliefrulifre" y una rápida sucesión de sílabas cortas "siylisiylididlidiliyie sí". Además, llamada "hueih-hueik" o "pik-pik".

Descripción: pico muy robusto oscuro con base grisácea. Macho muy llamativo: azul intenso oscuro. Frente, cejas, mejillas y hombros, celestes. Alas y cola negruzcas marginadas de azul. Zona de la cara cercana al pico, negra. Patas negruzcas. Hembra: pardo rojiza. Partes ventrales canela. Alas y cola pardas. Juvenil: similar a la hembra.

Alimentación: semillas, frutos pequeños y brotes.

Reproducción: nido en forma de taza de fibras vegetales recubierto de fibras más delicadas. Lo ubica en ramas a mediana y baja altura. Hasta 3 huevos celestes claros, con pintas castañas, más concentradas en un polo.

Hábitos: solitaria, en parejas o pequeños grupos. Se alimenta en el suelo o en ramas a mediana y baja altura.

Hábitat: selvas, bosques, sabanas, matorrales y espacios semiabiertos. En el Parque Nacional ocupa el talar.


RA

Hembra.



NA

Capuchino canela *Sporophila hypoxantha*



Familia: Thraupidae

Dimensiones: 10 cm.

Otros datos diagnósticos: pico corto y grueso. Macho con dorso grisáceo y vientre y rabadilla canela. Hembra parda.

Voz: silbido melódico algo lento "dliu dli diu chli clhiu…" con variaciones.

Descripción: semillero pequeño de pico corto y grueso. Macho: partes ventrales y rabadilla canela a canela-rojizo. Partes dorsales gris pizarra. Hembra: partes dorsales pardo oliváceo y partes ventrales más pardo amarillento más claro. Ambos sexos tienen banda alar blanca.

Alimentación: semillas de gramíneas y otras hierbas.

Reproducción: el nido tiene forma de tacita construido con fibras vegetales, cerdas y telas de araña. Lo ubica a baja altura en hierbas o arbustos. Pone hasta 3 huevos blancos con pintas y manchas oscuras.

Hábitos: generalmente en grupos, incluso con capuchinos de otras especies. Mientras se alimenta realiza movimientos acrobáticos en las plantas. Canta posado en la vegetación o en alambrados.

Hábitat: pastizales altos, preferentemente de ambientes húmedos. A menudo en áreas rurales y bordes de caminos. Sabanas con matorrales. En el área protegida habita los pajonales inundables de la terraza baja.

Presencia estacional: en otoño e invierno se desplaza hacia el norte.



HB

Capuchino garganta café *Sporophila ruficollis*



Familia: Thraupidae

Dimensiones: 10 cm.

Otros datos diagnósticos: pico corto grueso. Macho con dorso gris pizarra. Ventral y rabadilla castaño rojizo. Cola negra. Hembra pardo olivácea.

Voz: melodioso canto "fiu flí-chi chiiiiu…".

Descripción: semillero pequeño, de pico corto negro. Macho: corona y partes dorsales gris pizarra. Garganta y pecho café oscuro. Alas negras con plumas marginadas de gris y banda blanca. Cola negra. Partes ventrales y rabadilla castaño ocráceo. Forma (morfo) oscura: collar completamente café oscuro y espalda rojiza (rufa). Hembra: pardo-oliváceo con ventral más claro que el dorso. Partes dorsales pardo oliváceo y partes ventrales más pardo amarillento claro (muy similar a otras hembras de capuchinos). Juvenil macho: pico claro. Partes ventrales acaneladas. Plumajes intermedios hasta el definitivo adulto.

Alimentación: semillas de pastos y otras hierbas.

Reproducción: el nido tiene forma de tacita construido con fibras vegetales, cerdas y telas de araña. Lo ubica a baja altura en hierbas o arbustos. Pone hasta 3 huevos blancos con pintas y manchas oscuras.

Hábitos: generalmente en pequeños grupos, en bandadas mixtas con capuchinos de otras especies. Se mueve acrobáticamente para alimentarse en las plantas.

Hábitat: pastizales generalmente húmedos, cardales, cultivos. Tolera ambientes modificados. En el área protegida ocupa los pastizales de la terraza alta.

Presencia estacional: **:** en otoño-invierno se desplaza hacia el norte.



Capuchino pecho blanco *Sporophila palustris*



Familia: Thraupidae

Dimensiones: 10 cm.

Otros datos diagnósticos: pico corto, robusto. Dorso gris.. "Babero" blanco. Ventral pardo rojizo. Hembra pardo olivácea.

Voz: dulce y descendente silbido "tiu tiu-tupí tupliú uií…".

Descripción: semillero pequeño, de pico corto y negro. Macho: capucha y espalda gris. Gran "babero" blanco que contrasta con partes ventrales pardo rojizo. Alas negras con plumas marginadas de gris y banda blanca. En la forma (morfo) "collar blanco" la espalda y las partes ventrales son pardo acanelado. Tiene un gran collar blanco desde la mejilla que abarca todo el cuello y pechera blanca. Hembra: pardo oliváceo en las partes dorsales. Más clara ventralmente.

Alimentación: semillas, principalmente de gramíneas.

Reproducción: nido en forma de semiesfera, hecho con fibras vegetales generalmente unido a ramas o hierbas a baja altura en zonas palustres.

Hábitos: generalmente en pequeños grupos. En bandadas mixtas con capuchinos de otras especies. Se mueve acrobáticamente para alimentarse en las plantas.

Hábitat: habita en zonas pantanosas con pastos altos y maduros. En el área habita los pajonales inundables de la terraza baja.

Presencia estacional: Presencia estacional: migratoria. En otoño-invierno se desplaza hacia el norte.



Hembra.



PP

Capuchino castaño *Sporophila hypochroma*



Familia: Thraupidae

Dimensiones: 10 cm.

Otros datos diagnósticos: pico corto. Dorso gris oscuro. Ventral y rabadilla castaño rojizo. Hembra parda.

Voz: dulce y descendente silbido interrumpido por "chiu chiu chiii – chrrrrr chrrrrr-tliu fíí fíí…".

Descripción: semillero pequeño de pico corto y negro. Macho: partes dorsales grises. Partes inferiores y rabadilla color castaño rojizo oscuro. Mancha blanca en el ala. Hembra: pardo oliváceo en las partes dorsales. Más claras ventralmente.

Alimentación: semillas, principalmente de gramíneas.

Reproducción: nido en forma de semiesfera, hecho con fibras vegetales generalmente unido a ramas o hierbas a baja altura en zonas palustres.

Hábitos: generalmente en pequeños grupos. En bandadas mixtas con capuchinos de otras especies. Se mueve acrobáticamente para alimentarse en las plantas.

Hábitat: terraza baja (pajonales inundables). Pastizales altos inundables cerca de pantanos y otros ambientes palustres.

Presencia estacional: migratorio. En otoño invierno se desplaza hacia el norte, aunque algunos individuos pueden permanecer en la región.



Hembra.



PP

Cardenal copete rojo *Paroaria coronata*


JA

Familia: Thraupidae

Dimensiones: 19 cm.

Otros datos diagnósticos: capuchón rojo. Dorso gris y ventral blanco.

Voz: canto melódico. "tui tuiui tiu trului tiu…" y otro más lento " tiuu... tchiiip... tiu... tchip…".

Descripción: inconfundible. Capucho, que incluye copete y pecho, rojo. Partes ventrales blancas. Desde la nuca partes dorsales grises. Pico blanquecino con culmen oscuro. Juvenil: capucho pardo anaranjado. Las partes dorsales pardo oscuro. Pico oscuro.

Alimentación: come semillas, insectos, brotes jóvenes y frutos.

Reproducción: nido en forma de tacita, oculto en árboles y arbustos. Utiliza fibras vegetales. Pone hasta 3 huevos color oliváceo con manchitas parduscas.

Hábitos: en parejas o grupos. Bastante terrícola. Se alimenta en el suelo junto a otras especies semilleras.

Hábitat: montes de tipo chaqueño y del espinal. En el parque nacional se halla en el talar y en el bosque ribereño.


HC

Juvenil.



Frutero azul *Stephanophorus diadematus*


EM

Familia: Thraupidae

Dimensiones: 19 cm.

Otros datos diagnósticos: coloración general azul.

Voz: Canto agradable "shiu flui fliu fli fliu fli…". También "fiu fiu fiiii…" y otras voces.


Descripción: inconfundible. Color azul con cara y barba negras, copete frontal rojo muy corto y corona blanca. Alas y cola negras marginadas de azul. Pico corto y robusto, negro.

Alimentación: frutos, flores e insectos.

Reproducción: nido con forma de taza realizado con fibras vegetales. Ubicado hasta 4 m de altura en árboles o arbustos altos. Pone hasta 4 huevos crema a crema azulado con pintas púrpuras y grises, a veces con líneas finas.

Hábitos: solitario, en parejas o en bandadas con otras especies de aves. Generalmente en estrato medio a alto en la vegetación.

Hábitat: terraza alta y baja. Bosques (talar y ribereño). Incluso parques y jardines.


MC

Detalle del pico.



NA

Culebra acuática marrón

Erythrolamprus semiaureus



Familia: Dipsadidae

Dimensiones: no supera el 1 metro de longitud total.

Otros datos diagnósticos: dorsalmente castaña con escamas bordeadas de negro en el borde posterior (a veces también en bordes laterales). Ventral amarillento.

Descripción: tamaño mediano. Cabeza oblonga con hocico chato, ojos con pupila elíptica. Escamas del dorso lisas y redondeadas. Coloración olivácea dorsalmente, con escamas bordeadas (ribeteadas) de negro posterior y lateralmente (en algunos individuos solo dorsalmente); ventralmente crema-amarillento con estrías marginales pardas, en el borde posterior de las escamas. Labios más claros. Juveniles con manchas dorsales oscuras (no forman collares ni tienen bandas nucales). Una subespecie con coloración dorsal de puntos amarillento.

Alimentación: anfibios y peces pequeños.

Reproducción: ovípara. Pone hasta 15 huevos en zonas secas como la barranca. Las crías nacen entre fines de primavera y el verano.

Hábitos: semiacuática, dócil y diurna. Cazadora muy activa, captura sus presas nadando o al acecho entre la vegetación palustre. Se refugian bajo troncos o pilas de estiércol o leña.

Habitat: terraza baja (pajonal, bosque ribereño). Juncales, praderas, en cercanías del agua.



Detalle de la cabeza.



Culebra verde /culebra esmeralda

Philodryas aestiva



Familia: Dipsadidae

Dimensiones: 60 cm (macho); 100 cm (hembra).

Otros datos diagnósticos: llamativo dorso verde brillante. Ventralmente blanquecino verdoso. Cuerpo estilizado y cola larga. 21 o más hileras de escamas en la mitad del cuerpo; 184-201 ventrales y 120-140 subcaudales.


Descripción: verde vibrante dorsalmente, escamas de labios superiores amarillentas. Escamas aquilladas con dos fosetas apicales. Cabeza alargada, con hocico redondeado, prominente con una línea negra que atraviesa los ojos. Ojos grandes, dorado y pupila circular. Ventralmente blanco verdoso.

Alimentación: murciélagos, pequeñas aves, lagartijas, anfibios y peces.

Reproducción: en noviembre pone de 8 a 14 huevos oblongos, en nidos de hormigas podadoras. Nacimientos en diciembre a enero.

Hábitos: diurna. Trepadora, extremadamente veloz, ágil y agresiva. Muerde si se ve amenazada, aunque su veneno no resulta peligroso para los humanos.

Hábitat:. en cercanías del agua. En pastizales con árboles y arbustos dispersos. En el parque nacional ocupa los pastizales de la terraza alta.



Detalle de la cabeza.



MC

Falsa yarará ocelada

Tomodon ocellatus



Familia: Thraupidae

Dimensiones: 53 cm (machos), 50 cm (hembras).

Otros datos diagnósticos: parda. Dorso con semicírculos oscuros y línea blanca a todo lo largo del dorso.

Descripción: mimética con la yarará de la que se diferencia por el patrón de las manchas, la falta de foseta loreal y la presencia de escamas lisas. Robusta y de cola corta. Partes dorsales pardo (a pardo rojizo claro) con semicírculos oscuros, separados por una línea blanquecina que se extiende desde el cuello hasta la cola (incluida). "Lagrima" hasta la boca y banda angosta desde el ojo a la comisura pardo oscuro. Banda ancha "triangular" desde la corona casi hasta los flancos del cuello. Pupila elíptica a primera vista redondeada. Partes ventrales crema amarillento moteado de negro.

Alimentación: principalmente babosas, pero también insectos.

Reproducción: ovovivíparo. Alrededor de ocho crías principalmente de febrero a mayo. También los recién nacidos presentan las reacciones intimidatorias y mueren.

Hábitos: crepuscular y nocturna. Es un tanto agresiva. Atacada, se defiende con actitudes intimidatorias: dilata la parte posterior de la cabeza, ensancha el cuerpo y arrolla la cola. Su mordedura llega a inocular cantidades de veneno suficientes para provocar efectos locales y reacciones generales de cierta envergadura. Es más frecuente en febrero-abril.

Hábitat: pastizales. Áreas parquizadas. En lugares soleados, con vegetación herbácea terrenos altos o lomas. Utiliza cuevas (principalmente en invierno). Especie de probable presencia en el área protegida.



MC

Yararáa grande *Bothrops alternatus*



Familia: Viperidae

Dimensiones: hasta 130 cm, pero puede alcanzar dimensiones mayores en las provincias mesopotámicas. .

Otros datos diagnósticos: dorso pardo con manchas en "medialunas" oscuras. Líneas blancas en la cabeza que se cruzan. Ventral blanquecino.


Descripción: robusta. De cabeza "triangular", cuello delgado y cola corta. Hocico puntiagudo. Aspecto rugoso por escamas dorsales carenadas. Cabeza oscura con líneas blancas una en forma de "Ψ", con pequeñas escamas y foseta loreal. Dorso pardo a castaño con serie de manchas simétricas pardo oscuro "arriñonadas" o en forma de "Ω", bordeadas de finas líneas blanco y negro. Ventralmente blanquecina, con una banda oscura central en garganta cuello y parte anterior del cuerpo. El resto del vientre con dos series paralelas de manchas cuadradas muy oscuras hasta la cola.

Alimentación: pequeños mamíferos, principalmente roedores, además de anfibios.

Reproducción: vivípara, hasta 18 crías. Cría cerca de cuerpos de agua. Las crías nacen desde el verano hasta inicios del otoño.

Hábitos: crepuscular y nocturna, aunque puede verse de día. Irascible y agresiva, cuando se siente amenazada se enrolla con el cuello formando una "S" y la cabeza apuntando hacia el agresor. Agita la cola. Su veneno es una hemotoxina potente, cuya acción sobre la hemoglobina de la sangre impide el transporte de oxígeno a los tejidos. Aunque raramente mortal, puede causar daños locales serios.

Hábitat: ambientes húmedos o inundables, pajonales en orillas de cuerpos de agua, áreas cuya vegetación consiste en esparto *(Spartina sp.)* y otras gramíneas. En el área protegida ocupa el pajonal y el bosque ribereño, en la terraza baja.



Detalle de la cabeza.



Tortuga de río *Hydromedusa tectifera*



Familia: Chelidae

Dimensiones: tamaño mediano; caparazón hasta 28 cm de largo.

Otros datos diagnósticos: cabeza pequeña y puntiaguda, con hocico prominente y sin bárbulas en el mentón. Cuello largo, alarmada o en reposo, lo recoge en forma de "S". El caparazón es ovoide, con seis placas vertebrales convexas y cuatro placas laterales algo irregulares. Cada una de estas placas presenta un tubérculo o protuberancia central, junto con ornamentaciones notorias de estrías radiadas y concéntricas.

Descripción: el caparazón es de forma ovoide y de color pardo amarillento, con manchas oscuras en los bordes de las placas marginales. El plastrón es de tono blanquecino, más claro en las suturas, con zonas internas de las placas y la parte inferior de las marginales con manchas pardo-violáceas. La cabeza, la cola y la superficie superior de las extremidades tienen un tono grisáceo, mientras que la parte inferior es crema. Se distingue una línea negra que bordea la cabeza desde el hocico, atraviesa transversalmente el iris hasta la parte final del cuello. Otra línea negra recorre la parte inferior desde el borde mandibular hasta la región medio-lateral del cuello. Además, se observan manchas grisáceas u oscuras en la superficie inferior de las extremidades. La cola más bien reducida (más larga en los machos) con numerosos tubérculos redondeados. Diferenciarla de la tortuga de laguna *(Prhynops hylarii)*.

Alimentación: peces, anfibios y caracoles.

Reproducción: en la primavera, en las playas de los ríos que frecuenta pone huevos ovalados blanquecinos, de 30 mm de largo por 20 mm de ancho.

Hábitos: solitaria, es una activa buceadora. Arisca, se desplaza utilizando sus patas con membranas interdigitales. También es bastante ágil desplazándose en tierra arqueando el largo cuello en "S" de un lado a otro en la carrera. Al parecer hiberna sumergida.

Hábitat: ambientes acuáticos. Arroyos, ríos y lagunas. También ambientes antrópicos como tosqueras.



Detalle de la cabeza.



Tortuga pintada *Trachemys dorbigni*



Familia: Emydidae

Dimensiones: llegan a medir unos 27 cm.

Otros datos diagnósticos: caparazón relativamente alto con bordes escotados. Cabeza cuadrangular. Plastrón amarillento con mancha negra central. Mancha anaranjada que comienza detrás de los ojos y se extiende hasta llegar al cuello. Si bien es característica de la especie, no debe confundirse con una mancha similar de color rojo que presenta la exótica *(Trachemys elegans)*.

Descripción: Cabeza, cuello y extremidades color oliváceo con franjas amarillas longitudinales. Ojos amarillos, atravesados por una línea horizontal oscura. Caparazón color oliváceo, con manchas negras rodeadas por franjas verdes, amarillas y anaranjadas gruesas (más evidente en las hembras). Plastrón cubierto por una gran mancha central parda oscura, que se extiende hasta los bordes, mezclándose con un fondo amarillo. Esta mancha se presenta poco definida en los machos. La coloración es excepcionalmente vivaz en los juveniles. Caparazón ovalado, casi liso, algo más chato en el macho que en la hembra. Cola pequeña, algo mayor en los machos. Los géneros también se pueden diferenciar en que los machos tienen la cola más larga y gruesa.

Alimentación: esta tortuga es omnívora, aunque preferentemente carnívora. Se alimenta de plantas acuáticas, peces, anfibios y otros pequeños invertebrados. También come carroña.

Reproducción: ocurre en diciembre y enero. En un pozo excavado con las patas traseras ponen de 6 a 19 huevos blancos en zonas no inundables como la barranca, aunque por lo general son entre 8 a 14 en hasta tres puestas el mismo año.

Hábitos: acuáticas, en ocasiones gregarias en grupos cercanos a 50 individuos. Suelen verse en las orillas, embalsados y objetos flotantes, asoleándose en horas cálidas del día.

Hábitat: ambientes acuáticos. Todo tipo de curso de agua dulce, mayormente en los poco correntosos. Accidental en el Parque Nacional entre la vegetación acuática de lagunas u otros cuerpos de agua. También en pajonales inundables. Tal vez introducida, y a confirmar, pues es similar a la tortuga de orejas rojas *(Trachemys scripta)*. Esta última oriunda de América del Norte y una de las "peores especies exóticas invasoras", se la ha visto en la zona de la Tosquera (entre vías y la Panamericana).



Escuerzo común *Ceratophrys ornata*



Familia: Ceratophryidae

Dimensiones:
hasta 12,5 cm.

Otros datos diagnósticos:
cuerpo globoso y robusto. Coloración dorsal llamativa verde, rojiza y parda.

Voz: canto potente, sonido fuerte de pocas silabas semejante a un "Huuuuuaá..." durante los meses de primavera y verano.

Descripción: robusto y compacto. Cuerpo globoso. Partes dorsales de coloración estridente: verde vibrante, rojizos y pardos. Crestas oculares prominentes. Ojo circular blancuzco con pupila circular, atravesado por una faja parda. Esta faja se continúa hacia delante y hacia atrás de la cabeza. Hacia adelante lo hace pasando por la narina y casi hasta el centro del labio superior. Hacia atrás, hasta el tímpano y de allí hacia abajo. Las partes ventrales son blanquecinas, con laterales amarillentos, en la garganta manchada de pardo oscuro. Boca enorme. Saco gular simple, medio y regular.

Alimentación: pequeños vertebrados (anfibios y pichones de aves). Para cazar suelen permanecer enterrados dejando sólo los ojos por fuera a la espera del paso de una presa.

Reproducción: se reproduce en campos inundados y zonas anegadas por grandes lluvias. Coloca los huevos aisladamente en el fondo del agua, rodeados por una sustancia gelatinosa.

Hábitos: terrestre (cavícola). Se observan luego de las grandes tormentas, momento en el cual salen de sus cuevas. Al ser perturbado abre sus fauces en actitud amenazante, incluso intentando morder a su oponente.

Hábitat: luego de grandes tormentas asoman de sus cuevas en las que permanecen enterrados la mayor parte del tiempo. Aparece luego de lluvias copiosas o inundaciones. En el Parque Nacional ocupa los pastizales de la terraza alta.




Renacuajo.



JM

Ranita trepadora pintada

Nyctimantis (Argenteohyla) siemersi



Familia: Hylidae

Dimensiones: macho hasta 67mm, hembra hasta 70 mm.

Otros datos diagnósticos: datos diagnósticos: coloración parda clara, parda oscura con líneas más oscuras. Zonas ocultas con máculas rojas.

Voz: recuerda el motor de un viejo tractor en reposo. Áspero y continuo "chas chas chas chas chas…".

Descripción: partes dorsales castaño bronceado con tres líneas longitudinales más oscuras en el dorso. Línea oscura que nace en las narinas, pasa por ojos, y se extiende por los flancos con un reticulado que llega hasta las patas posteriores. Sacos vocales, axilas, ingles y partes ocultas durante la posición de flexión, con manchas redondeadas color rojo coral. Partes ventrales violácea, más oscura en plantas y palmas. Cabeza casi tan ancha como larga. Hocico redondo. Tímpano notorio. Dorsalmente piel lisa, mientras que ventralmente es granulada. Machos con dos sacos vocales bien desarrollados, expandidos lateralmente

Alimentación: pequeños invertebrados.

Reproducción: en cuerpos de agua semipermanente con vegetación palustre. En reproducción, los machos vocalizan luego de fuertes lluvias y a plena luz del día; emergiendo su cabeza y desapareciendo a la menor perturbación. El sonido que emiten es similar al de un motor de explosión.

Hábitos: individuos hembras han sido encontrados refugiados en hojas de *Eryrigium sp.*, planta conocida popularmente como "caraguatá".

Hábitat: no se ha registrado en el Parque Nacional, pero es probable su presencia. Cardales de *Eryrigium sp.,* pajonales y pastizales inundables.



RNRSM



Ranita silbadora *Physalaemus fernandezae*


MC

Familia: Leiuperidae

Dimensiones: tamaño pequeño, hasta 2,2cm.

Otros datos diagnósticos: parda con manchas oscuras. Antifaz oscuro. Hocico redondeado.

Voz: canto agudo como silbo humano levemente ascendente "suiiií…".

Descripción: hocico redondeado. Coloración general parda con manchas irregulares más oscuras. Algunos individuos presentan una línea media dorsal clara o incluso verde. Posee un medio antifaz oscuro desde la punta del hocico, cubre las narinas, la mitad de los ojos y se extiende hasta las extremidades anteriores. Debajo de los ojos, bordeando por debajo el parche descripto anteriormente se extiende una línea blanca hasta los miembros anteriores. Partes ventrales con manchas o punteado gris.

Alimentación: insectos y otros artrópodos pequeños.

Reproducción: los machos cantan flotando sobre el agua. Emiten un sonido agudo similar a un silbido. Realizan nidos de espuma pequeños (3 o 4 cm de diámetro) en la superficie del agua, asociados a las matas de vegetación. Se reproduce en invierno, verano y otoño.

Hábitos: en los meses cálidos puede refugiarse debajo de hojas o en grietas que luego suelen anegarse.

Hábitat: pastizales salino e inundables de la terraza baja.


AG

Nido de espuma.



Culebra ciega del Río de la Plata

Chthonerpeton indistinctum



Familia: Ceciliidae

Dimensiones: alrededor de 44 cm de largo

Otros datos diagnósticos: anfibio de cuerpo cilíndrico. Cabeza puntiaguda. Cuerpo con 77 segmentos casi indistinguibles. Dorso gris azulado o violáceo. Vientre más claro.

Descripción: anfibio sin extremidades. Cuerpo más bien cilíndrico y liso con 70 a 80 pliegues. Cabeza puntiaguda, aplanada, con hocico redondeado saliente. Mandíbula inferior con dos hileras de dientes. Ojos diminutos. Pequeño tentáculo sensorial retráctil ubicado sobre la boca y equidistante entre ojos y narinas. Cola muy corta o ausente. Dorso oscuro azulado y brillante. Vientre gris blanquecino con manchas claras muy pequeñas. Mandíbula inferior bordeada con una línea clara.

Alimentación: renacuajos, lombrices, arañas, larvas de libélulas y crustáceos.

Reproducción: vivíparos, hasta 4 crías de hasta 11 cm de largo, sin branquias externas y envueltas con una fina membrana blancuzca.

Hábitos: acuático, buen nadador y de hábitos cavadores. Se lo encuentra en costas de ríos y pantanos costeros entre camalotes y troncos. Suele aparecer en grandes inundaciones relacionados con camalotales.

Hábitat: bosque ribereño. Litoral costero y áreas inundables. Debido a sus hábitos acuáticos y subterráneos, el hallazgo de esta especie es esporádico.



Cabeza detalle



AJ



TINGAZÚ - *Piaya cayana*

LISTADO DE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS DE VALOR ESPECIAL DEL PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

MAMÍFEROS

FAMILIA	Especie	Nombre vulgar	Registros
Didelphidae	*Cryptonanus chacoensis*	Comadrejita ágil	☐☐☐☐
Dasypodidae	*Dasypus novemcinctus*	Tatú negro/ Mulita grande/ Armadillo de nueve bandas	☐☐☐☐
Vespertilionidae	*Lasiurus (Aeorestes) villosissimus*	Murciélago escarchado/ Escarchado grande	☐☐☐☐
Vespertilionidae	*Lasiurus blossevillii*	Murciélago rojizo boreal/ Escarcha do chico	☐☐☐☐
Canidae	*Lycalopex gymnocercus antiquus*	Zorro gris pampeano	☐☐☐☐
Felidae	*Leopardus geoffroyi*	Gato montés	☐☐☐☐
Mephitidae	*Conepatus chinga*	Zorrino común	☐☐☐☐
Mustelidae	*Galictis cuja huronax*	Hurón menor	☐☐☐☐
Mustelidae	*Lontra longicaudis*	Lobito de río	☐☐☐☐
Procyonidae	*Procyon cancrivorus*	Aguará popé/ Mayuato/ Osito lavador	☐☐☐☐
Cervidae	*Blastocerus dichotomus*	Ciervo de los pantanos	☐☐☐☐

FAMILIA	Especie	Nombre vulgar	Registros
Cricetidae	*Bibimys torresi*	Ratón hocico rosado/ de cola bicolor	
Cricetidae	*Deltamys kempi*	Ratón del delta / isleño	
Cricetidae	*Necromys lasiurus*	Ratón cavador pampeano/ campestre / cola peluda	
Cricetidae	*Oxymycterus rufus*	Hocicudo común/ rojizo	
Cricetidae	*Reithrodon auritus*	Rata conejo	
Cricetidae	*Scapteromys aquaticus*	Rata de pajonal/ acuática	
Caviidae	*Hydrochoerus hydrochaeris uruguayensis*	Carpincho	
Echimyidae	*Myocastor coypus*	Falsa nutria / coipo	



ZORRINO COMÚN - *Conepatus chinga*

FAMILIA	Especie	Nombre vulgar	Registros
Tinamidae	*Rhynchotus rufescens*	Perdiz colorada	
Anatidae	*Cygnus melancoryphus*	Cisne cuello negro	
Anatidae	*Netta peposaca*	Pato picazo	
Anatidae	*Heteronetta atricapilla*	Pato cabeza negra	
Cracidae	*Penelope obscura*	Pava de monte ribereña	
Cuculidae	*Coccycua cinerea*	Cuclillo chico	
Cuculidae	*Piaya cayana*	Tingazú	
Rallidae	*Coturnicops notatus*	Burrito enano	
Rallidae	*Laterallus leucopyrrhus*	Burrito colorado	
Rallidae	*Porzana spiloptera*	Burrito negruzco	
Rallidae	*Mustelirallus albicollis*	Burrito grande	
Charadriidae	*Charadrius modestus*	Chorlito pecho canela	
Charadriidae	*Oreopholus ruficollis*	Chorlo cabezón	
Pandionidae	*Pandion haliaetus*	Águila pescadora	
Accipitridae	*Buteogallus urubitinga*	Águila negra	
Accipitridae	*Parabuteo unicinctus*	Gavilán mixto	
Strigidae	*Asio flammeus*	Lechuzón de campo	

FAMILIA	Especie	Nombre vulgar	Registros
Picidae	*Melanerpes candidus*	Carpintero blanco	☐☐☐☐
Picidae	*Dryobates mixtus*	Carpintero bataraz chico	☐☐☐☐
Thamnophilidae	*Thamnophilus ruficapillus*	Choca corona rojiza	☐☐☐☐
Thamnophilidae	*Thamnophilus caerulescens*	Choca común	☐☐☐☐
Furnaridae	*Limnornis curvirostris*	Pajonalera pico curvo	☐☐☐☐
Furnaridae	*Syndactyla rufosuperciliata*	Ticotico estriado	☐☐☐☐
Furnaridae	*Asthenes hudsoni*	Espartillero pampeano	☐☐☐☐
Furnaridae	*Limnoctites rectirostris*	Pajonalera pico recto	☐☐☐☐
Furnaridae	*Cranioleuca sulphuriferus*	Curutié ocráceo	☐☐☐☐
Furnaridae	*Spartonoica maluroides*	Espartillero enano	☐☐☐☐



BURRITO NEGRUZCO - *Porzana spiloptera*

FAMILIA	Especie	Nombre vulgar	Registros
Furnaridae	*Certhiaxis cinnamomeus*	Curutié colorado	
Tityridae	*Pachyramphus viridis*	Anambé verdoso	
Tyrannidae	*Phylloscartes ventralis*	Mosqueta carasucia	
Tyrannidae	*Elaenia spectabilis*	Fiofío grande	
Tyrannidae	*Camptostoma obsoletum*	Piojito silbón	
Tyrannidae	*Polystictus pectoralis*	Tachurí canela	
Tyrannidae	*Knipolegus cyanirostris*	Viudita pico celeste	
Tyrannidae	*Lathrotriccus euleri*	Mosqueta parda	
Vireonidae	*Cyclarhis gujanensis*	Juan chiviro	
Hirundinidae	*Riparia riparia*	Golondrina zapadora	
Hirundinidae	*Petrochelidon pyrrhonota*	Golondrina rabadilla canela	
Fringillidae	*Euphonia chlorotica*	Tangará garganta negra	
Icteridae	*Leistes superciliaris*	Pecho colorado	
Icteridae	*Amblyramphus holosericeus*	Federal	
Icteridae	*Cacicus solitarius*	Boyero negro	
Icteridae	*Cacicus chrysopterus*	Boyero ala amarilla	
Parulidae	*Basileuterus culicivorus*	Arañero coronado chico	

FAMILIA	Especie	Nombre vulgar	Registros
Cardinalidae	*Cyanoloxia glaucocaerulea*	Reinamora chica	
Cardinalidae	*Cyanoloxia brissonii*	Reinamora grande	
Thraupidae	*Sporophila hypoxantha*	Capuchino canela	
Thraupidae	*Sporophila ruficollis*	Capuchino garganta café	
Thraupidae	*Sporophila palustris*	Capuchino pecho blanco	
Thraupidae	*Sporophila hypochroma*	Capuchino castaño	
Thraupidae	*Microspingus cabanisi*	Monterita litoral	
Thraupidae	*Paroaria coronata*	Cardenal copete rojo	
Thraupidae	*Stephanophorus diadematus*	Frutero azul	
Thraupidae	*Pipraeidea melanonota*	Saíra de antifaz	



TANGARÁ GARGANTA NEGRA - *Euphonia chlorotica*

REPTILES

ANFIBIOS

FAMILIA	Especie	Nombre vulgar	Registros
Dipsadidae	*Erythrolamprus semiaureus*	Culebra acuática marrón/ de agua	
Dipsadidae	*Philodryas aestiva subcarinata*	Culebra verde	
Dipsadidae	*Tomodon ocellatus*	Falsa yarará ocelada	
Viperidae	*Bothrops alternatus*	Yarará	
Chelidae	*Hydromedusa tectifera*	Tortuga de río	
Emydidae	*Trachemys dorbigni*	Tortuga pintada	
Ceratophrydae	*Ceratophrys ornata*	Escuerzo común	
Hylidae	*Nyctimantis (Argenteohyla) siemersi*	Rana Trepadora pintada	
Hylidae	*Ololygon berthae*	Ranita trepadora hocicuda chica/ de pintas naranjas	
Hylidae	*Scinax granulatus*	Rana roncadora	
Hylidae	*Scinax nasicus*	Rana de pileta	
Leptodactylidae	*Physalaemus fernandezae*	Macaquito/ Ranita silvadora	
Microhylidae	*Elachistocleis bicolor*	Ranita panza amarilla	
Odontophrynidae	*Odontophrynus americanus*	Escuercito común	
Caecilidae	*Chthonerpeton indistinctum*	Cecilia/ Culebra ciega del Río de la Plata	

FAMILIA	Especie	Nombre vulgar	Registros
Curimatidae	*Steindachnerina biornata*	Sabalito	
Prochilodontidae	*Prochilodus lineatus*	Sábalo	
Characidae	*Hyphessobrycon reticulatus*	Mojarra	
Characidae	*Salminus brasiliensis*	Dorado	
Characidae	*Cheirodon interruptus*	Mojarrita/piavá	
Characidae	*Mimagoniates inaequalis*	Tetra	
Erithrinidae	*Hoplias malabricus*	Tararira	
Callichthyidae	*Callichthys callichthys*	Cascarudo	
Pimelodidae	*Luciopimelodus pati*	Patí	
Pimelodidae	*Pimelodus maculatus*	Bagre amarillo	
Rivulidae	*Austrolebias bellottii*	Pavito/cinolebia	
Rivulidae	*Argolebias nigripinnis*	Pavito/cinolebia	
Synbranchidae	*Synbranchus marmoratus*	Anguila criolla	
Cichlidae	*Gymnogeophagus australis*	Chanchita	
Cichlidae	*Gymnogeophagus meridionalis*	Chanchita	



PATÍ - *Luciopimelodus pati*

EPÍLOGO

El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es un sitio especial en el que convergen tres ecorregiones de nuestro querido país. Este encuentro de naturaleza se ve evidenciado en el número de especies que habitan un área dinámica en aspectos naturales y culturales.

A lo largo de esta guía, se ha buscado acercar al lector a la riqueza y singularidad de las **Especies de Vertebrados de Valor Especial del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos**, no solo como objetos de estudio, sino como protagonistas de una trama ecológica compleja que merece ser comprendida y conservada.

La diversidad aquí presentada —que abarca mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces— da cuenta de la extraordinaria heterogeneidad ambiental del área.

Las 103 especies identificadas, y en particular las 40 prioritarias, constituyen indicadores sensibles del estado de conservación del área. Su presencia, ausencia o variación poblacional nos habla de procesos más amplios: cambios ambientales, presiones antrópicas y también de los logros alcanzados en materia de conservación. En este sentido, cada registro, cada observación y cada anotación realizada por guardaparques, investigadores o visitantes aporta una pieza fundamental para la construcción de conocimiento.

Esta guía no pretende ser un punto de llegada, sino un punto de partida. La idea es invitar a mirar con mayor atención, a registrar con mayor compromiso y a valorar con mayor profundidad. En un contexto global donde la biodiversidad enfrenta amenazas crecientes, el compromiso local adquiere un valor estratégico. La conservación no es una tarea exclusiva de especialistas, sino una responsabilidad compartida entre instituciones y sociedad.

Por ello los textos presentados pretenden ser sencillos, para la lectura de un público amplio sin ir en desmedro de la información técnica necesaria para la identificación de campo.

Finalmente, se espera que las páginas de NOTAS que cierran la obra no permanezcan vacías. Que se llenen de huellas, de nombres, de dibujos y de preguntas. Porque allí, en ese ejercicio de observación y curiosidad, comienza también el camino hacia una relación más consciente y respetuosa con la naturaleza.

Conocer el parque, en definitiva, es un primer paso para cuidar una parte irremplazable de nuestro patrimonio natural.

Notas

Notas

Notas

Notas



WP **TORTUGA PINTADA -** *Trachemys dorbigni*

GLOSARIO

Bandadas mixtas: grupos formados por individuos de diferentes especies de aves, que se desplazan y se alimentan en conjunto. Son comunes fuera del período de reproducción.

Bárbula: mentón o barbilla. Aplicado a reptiles y peces refiere a cada uno de los apéndices carnosos que se hallan a los lados de la boca o en el mentón.

Carapacho: caparazón.

Corona: parte superior de la cabeza de un ave, entre la frente y la nuca.

Egagrópila: bolo que regurgitan principalmente las aves rapaces que contiene partes indigeribles de sus presas. Pueden contener huesos, pelos, plumas, exoesqueletos de insectos, entre otras partes animales.

Endemismo/endémica: en biología, refiere a un taxón que habita en un determinado territorio o zona geográfica (bioma, ecorregión) no hallándose, en forma natural, en otra parte del planeta .

Especie: en biología se define como tal al conjunto de organismos que comparte las mismas características biológicas, tiene un mismo origen embrionario y, en condiciones naturales, son capaces de reproducirse y procrear descendencia fértil.

Foseta loreal: orificio que se encuentra entre el ojo y la fosa nasal en las serpientes venenosas, en el que se encuentra un órgano termorreceptor que les permite percibir las variaciones en la temperatura externa.

Gular: que corresponde a la garganta.

Omnívoro: se aplica a los animales que pueden alimentarse de distintas fuentes orgánicas animales y vegetales.

Palustre: que pertenece o se relaciona con una laguna o pantano o marisma.

Plastrón: parte ventral del caparazón de una tortuga.

Subcaudal: región del cuerpo formado por plumas pequeñas que cubren la base inferior de la cola.

Subespecie: cada uno de los grupos en que se divide una especie, que presentan variaciones con relación a otros grupos de la misma especie.

Taxón: cada una de las unidades sistemáticas que, organizadas jerárquicamente, se emplean en la clasificación de los seres vivos. Por ejemplo: especie, género, familia, orden.



CISNE DE CUELLO NEGRO - *Cygnus melancoryphus*

FOTÓGRAFOS

ACCG: Adriana Almirón- Jorge Casciotta- Liliana Ciotek- Pablo Giorgis
AdB: Alex De Bonis
AE: Alec Earnshaw
AJ: Ademir Jerónimo
AG: Atílio Guzmán
AL: Ariel López
AO: Agustín Olmedo
A&R: Gabriela Agustin e Ignacio Roeler
AS: Astrid Sanguinetti
CDT: Claudio Díaz Timm
DS: Dario Sánches
DSe: David Sedlecký
EG: Elena Gangerova
EB: Ezequiel Bonafede
EM: Eduardo Militello
EMP: Emilio Martín Pérez
FF: Fernando Flores
FU: Félix Uribe
GA: Guadalupe Arata
GV: Gerardo Vega
HB: Héctor Ball
HBo: Hector Bottai
HC: Holly Cox
HI: Hernán Ibañez
IH: Ignacio Hernández
JA: Julián Alonso
JAp: José Aparicio
JG: Joaquín Ghiorzo
JLS: Jorge López Soriano
JM: Jorge Meriggi
JMo: Julio Monguillot
MB: Mario Beade
MC: Marcelo Canevari
MM: Mauricio Manzione
NA: Nick Atanas
PM: Patrick Monney
PP: Pablo Petracci
PW: Philippe W.
RA: Romina Achirri
SC: Soledad Castillo
RK: Rom Knigh
SP: Sebastian Preisz
SV: Silvina Vitale
WP: Walter Prado

RNF: Reserva Natural Formosa
RNRSM: Reserva Natural Rincón de Santa María

BIBLIOGRAFÍA

Cei, J.M. (1980). *Amphibians of Argentina. Monit.* Zool. Ital. Monogr.Nº 2, Torino.

Cei, J. M. (1993). *Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina. Herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampas.* Monografia XIV. Museo Regionale di Scienze Naturali. Torino.

Canevari, M. y M. Manzione, editores (2024). *Guía de Campo Digital de las Aves de Argentina.* Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. [Aplicación Móvil].

Canevari, M.; O. Vaccaro y G. Carrizo. (2007). *Guía de Mamíferos del Sur de América del Sur.* L.O.L.A. Buenos Aires.

Gallardo, J.M. (1987). *Anfibios Argentinos. Guía para su identificación.* Librería agropecuaria S.A. Buenos Aires.

Guzmán, Atilio y Leonardo Raffo. (2011). *Anfibios del Parque Nacional El Palmar y la Reserva Natural Otamendi.* Editorial APN. Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires.

Haene, E. y J. Pereira (ed.) (2003) *Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi* (Campana, Provincia de Buenos Aires, República Argentina). Monografía de Aves Argentinas, Temas de Naturaleza & Conservación, 3. Buenos Aires.

Heredia, Javier. (2008). *Anfibios del centro de Argentina.* L.O.LA. Buenos Aires.

Lavilla, E y J. M.Cei. (2001). *Amphibians of Argentina*. A Second Update, 1987-2000. Monogr. XXVIII. Museo Regionale di Scienze Naturali Torino. https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Lontra%20longicaudis

Manzione, M.; L. Molinari; P. Reggio; E. Rodríguez Viudez y H. Sagristá. (En prensa). *Parques Nacionales en el aula. Herramientas educativas para valorar el patrimonio natural y cultural en nuestras áreas protegidas nacionales.*

Manzione, M.; D. Arnica y L. Fabris. (2023). *Registro de zorro de monte (Cerdocyon thous) en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Buenos Aires, Argentina.* Informe Administración de Parques Nacionales: IF-2023-90421401-APN-DNC#APNAC.

Mares, M.A., Ojeda, R.A. y R.M. Barquez. (1989). *Guía de los Mamíferos de la Provincia de Salta, Argentina.* University of Oklahoma Press. U.S.A.

Norman, D. R., (1994). *Anfibios y reptiles del Chaco Paraguayo.* Amphibians and reptiles of the Paraguayan Chaco. Volume I. Fotografías por Lawrence Naylor. 1ra edición. San José. 281 pp.

Porini, Gustavo; Bó, Roberto F.; Guichón, María Laura; Corriale, María José; Courtalón, Paula; Bolkovic, María Luisa (2019). *Myocastor coypus*. En: SAyDS–SAREM (eds.) Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de los mamíferos de Argentina. Versión digital: http://cma.sarem.org.ar.

Povedano, Hernán et al. (2022). *Reptiles de Buenos Aires*. Ediciones LBN (Guías completas de la fauna bonaerense). La Plata- Pcia. Buenos Aires.

Williams, J.D. y G. Scrocchi, (1994). *Ofidios de Agua Dulce de la República Argentina.* En: Z. de Castellanos (dir.) Fauna de agua dulce de la República Argentina, 42 (3). PROFADU (CONICET).



LCCG

CHANCHITA, SIETE COLORES - *Gymnogeophagus meridionalis*



RANA DE PILETA - *Scinax nasicus* **AG**



ZORRO DE MONTE - *Cerdocyon thous*

Se editó en agosto de 2026





Esta novedosa guía, con enfoque en el monitoreo de fauna en los parques nacionales, permite identificar y conocer animales que los especialistas consideran claves para el seguimiento de la fauna del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

Estas especies, calificadas de valor especial, pueden estar en peligro, ser escasas, o encontrarse aquí en una situación diferente a otras localidades del resto del país.

Otras son clave para el ecosistema local o son especialmente valoradas por la sociedad. Varias especies cuentan con escasos registros y el uso de esta guía podría facilitar en gran manera la confirmación de su presencia en el parque.

Mauricio Manzione es un reconocido zoólogo que ha desarrollado su carrera tanto en el ámbito de las ONGs como en el sector público, con experiencia en la producción de materiales gráficos y el reconocimiento de especies a campo.

Considero esta obra un aporte a la gestión de la biodiversidad en este parque nacional, el que demanda un alto esfuerzo de monitoreo ya que su fauna podría declinar abruptamente debido a las alteraciones ambientales propias de un paisaje periurbano.

Mgst. Leonardo Raffo

ISBN 978-987-1363-51-3



